

Desgomin

Жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат без альдегидов и ЧАС

- ▲ Чистящее и дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхностей, сертифицированное по европейским стандартам EN и внесено в регистр ИНО
- ▲ Без альдегидов, фенолов и металлоорганических активных веществ
- ▲ Активно чистящее и с нейтральным запахом
- ▲ Эффективно против грамположительных и грамотрицательных бактерий (в т.ч. сальмонеллы и листерии), дрожжевых грибков и оболочечных вирусов (ограниченно вирулицидный, в т.ч. ВИЧ, вирус гепатита В, вирус гепатита С)
- ▲ Эффективно против SARS-CoV-2 (EN 14476)
- ▲ Сертификат соответствия для применения в продовольственном секторе в наличии
- ▲ Содержит возобновляемое сырье на растительной основе



Область применения

Для чистки и дезинфекции водостойких стен, пола, потолков и мебели в зонах, в которых особенно важно соблюдение гигиены. Возможно применение также для чистки напольных покрытий с защитным слоем.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.


Приготовление рабочего раствора:

Для раствора всегда использовать холодную воду! Дозировку см. в таблице. Заправить пенораспылитель на 500 мл с помощью подходящей дозирующей системы Kiehl (например, DosiStation, DosiJet). Использовать 5-литровую тару с подходящей дозирующей системой Kiehl (например, DosiStation, Arcantec, DosiJet). В зависимости от области применения навинтить пенораспылительную головку или распылительное сопло.

Дезинфицирующая чистка:

Поверхность полностью смочить дезинфицирующим раствором (прибл. 15–20 мл/м²) и обработать чистящей тканью или чистящим устройством. Расход: 0,1 мл/м².

Поверхности и кухонные приборы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, после окончания времени воздействия тщательно промыть питьевой водой.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Применяйте биоцидные средства с осторожностью. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией на этикетке и в информационном листе.
PT 02, PT 04

Номер артикула	Упаковочная единица (уе)	Количество упаковочных единиц на палете
j350602	6 дозирующих бутылок x 1 л (коробка)	84
j350605	2 канистры x 5 л (коробка)	56

Desgomin

Жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат без альдегидов и ЧАС

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, анионные ПАВ < 5 %, комплексообразователи, биоциды.
показатель pH в концентрате: прибл. 10

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 10

Активные вещества в 100 г:

6,7 г N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (CAS: 2372-82-9).

Маркировка

Маркировка (в концентрате): G05, G09, Опасен. H290 Может вызывать коррозию металлов. H315 При попадании на кожу вызывает раздражение. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. P264 После работы тщательно вымыть руки. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью. P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки. P501 Утилизируйте содержимое/контейнер на соответствующем предприятии по переработке или утилизации отходов. Содержит: Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)

Проверки и занесение в регистр

Рекомендации по дозированию для дезинфекции поверхностей в сфере здравоохранения

Метод испытания	Спектр эффективности воздействия	Степень нагрузки	Дозировка		Время воздействия	Тестируемые микроорганизмы
EN 13697 Дезинфекция поверхностей без механической обработки	бактерицидный / левуорцидный	высокий	5 %	500 мл/10 л	5 мин	Staphylococcus aureus в т.ч. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Модифицированный вирус осповакцины Анкара (MVA)
EN 14476 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	ограниченно вирулицидный					

Рекомендации по дозированию для дезинфекции поверхностей в промышленном, корпоративном и продовольственном секторах

Метод испытания	Спектр эффективности воздействия	Степень нагрузки	Дозировка		Время воздействия	Тестируемые микроорганизмы
EN 13697 Дезинфекция поверхностей без механической обработки	бактерицидный / левуорцидный	высокий	1,5 %	150 мл/10 л	30 мин	Staphylococcus aureus в т.ч. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Модифицированный вирус осповакцины Анкара (MVA)
EN 14476 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	ограниченно вирулицидный					

Desgomin

Жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат без альдегидов и ЧАС

Дальнейшие проверки

Метод испытания	Спектр эффективности воздействия	Степень нагрузки	Дозировка	Время воздействия	Тестируемые микроорганизмы	
промышленный, корпоративный и продовольственный секторы						
EN 1276 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	бактерицидный	высокий	1 %	100 мл/10 л	5 мин	Staphylococcus aureus в т.ч. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	левуорцидный	высокий	0,5 %	50 мл/10 л	15 мин	Candida albicans
сфера здравоохранения						
EN 13727 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	бактерицидный	высокий	1 % 0,25 %	100 мл/10 л 25 мл/10 л	5 мин 60 мин	Staphylococcus aureus в т.ч. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	левуорцидный	высокий	1 % 0,25 %	100 мл/10 л 25 мл/10 л	5 мин 60 мин	Candida albicans
Вируциды						
EN 14476 Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	ограниченно вирулицидный	высокий	3 % 2 % 1,5 %	300 мл/10 л 200 мл/10 л 150 мл/10 л	5 мин 15 мин 30 мин	Модифицированный вирус осповакцины Анкара (MVA)
DVV/RKI Количественный метод определения количества бактерий в суспензии	ограниченно вирулицидный	с	2 %	200 мл/10 л	60 мин	Вакциноподобный вирус, вирус бычьей вирусной диареи (BVDV)

* согласно рекомендации RKI в Федеральном вестнике здравоохранения 01-2004, см. также www.desinfektionsmittelliste.de